



BIBLIOTHECA  
MUSEI HIST. NAT.  
ROMANAE  
1804-1805

# DEO OPTIMO MAX. UNI ET TRINO.

VIRGINI DEI PARÆ, ET S. LUCÆ  
Orthodoxorum Medicorum Patrono.

## QUÆSTIO MEDICA,

*QUOD LIBETARIIS DISPUTATIONIBUS  
manè discutienda, in Scholis Medicorum, die Jovis duodecimo mensis  
Januarii anni M. DCC. XXXVI.*

M. JACOBO ALBERTO HAZON,  
Doctore Medico, Præside.

*'An uteri inflammationi post partum, vena scissio è brachio?*

I.



T' partus succedat feliciter, plurima requiruntur, 1°. Ut fiat tempore legitimo, absoluto nempe à conceptionis die mense ad minus septimo, alioquin partus, jam non partus, abortum saperet provocatum causâ non naturali. 2°. Adsit partium, corporis muliebris apta conformatio, ossium præcipue quæ pelvis in infimo ventre constituunt justa comparatio: non enim ab utero, non à membranis, non à fœtu reperenda plerumque partus difficultas, sed ab angustia pelvis: pelvis angustiam repetere ab osse sacro, & osse pubis; ab osse sacro, si nimium intra deflectat; ab osse pubis, si non satis extra promineat, sitque nimium intus compressum: hæc duo ossa sic nimium vicina, sunt veluti duo admoti parietes, efficiunt cingulum respectu uteri orificii, supereminet enim ipsum uteri corpus, exilientique fœtui repagulum: hinc & inde in conformatione defectus, hinc & inde vix ullâ arte superandus obex. 3°. Sit mulier boni habitus,

A

non acuto laceffita morbo, chronico-ve nimium debilitata; verteret in matris perniciem partus omnium morborum acutiffimus, 4°. Sint conftantes matris vires tempore & loco attemperatæ. Dolores fint legitimi, non, nothi: ex lumbis incipientes, continuò procedant deorfum ad anteriora, ut loqui amat gens obftetricans, verfus regionem pubis & coxendicum: illi fint vegeti, preffî & continui; hi dolores adhibentur cum ufurâ virium; diaphragma, mufculos abdominales, utrique fibras in actum proiciri indicant, inftareque partum certò denuntiant: nothi verò faciunt virium jacturam, neftunt parturienti moras, obftetricanti dubium injiciunt, mentiunturque incautis dolores, vel colicos, vel nephriticos. 5°. Sefe habeant omnia quantum volueris feliciter, defideratur ali- quando rectus uteri fitus, maximè circa ultima gftationis tempora. Illuftriffimus Deventer \* uteri fundum anteriùs vel pofteriùs ad lævam vel dextram prolabi demonftrat; uterus jam, non ut ante, fuis continetur ligamentis, nec mirum, non omni ex parte æqualiter extenditur, folus uteri fundus crefcit, & crefcendo affurgit, \* ita, quæ uteri partem fuperiorem occupabant ligamenta, infimam tantum amplectuntur verfùs ultima graviditatis tempora: fic uteri fundi ampliata moles ferè ompino libera & ab omni foluta vinculo, pondere alioquin gemens infueto, nutat ut plurimum. Hanc in genere doctri nam fenfit Hippocrates & plurimis locis prælibavit. \* 6°. Aquarum eruptione lubricato itinere, ut autem tempore fuo erumpant aquæ, membranæ nec teneriores nec firmiores debent effe, fœtus liberiorem ambiens auram, mutuat præbere debet operam, ut nifu & renixu fefe expediat à vinculis; ad id neceffum eft ut robore polleat non mediocri, in fitu difponatur convenienti, molemque non referat exiturius hofpes limine grandiorum. 7°. Fœtu in lucem egito, venit liberanda mulier placen- tæ membranarumque farcinâ, everrenda eft concreti fanguinis, muci, humorum-ve fabuttra: uteri cavitatem integrè non vacuare piaculum: in ipfius capacitate re- lictâ vel minimâ placen- tæ, concreti fanguinis, membranarum-ve portiunculâ, non fringit fe undique uterus, aperta manent vaforum oftia, pleno fluit alveo purpureus latex non-nifi cum vitâ exhauriendus. 8°. Uteri vafis imbibita dudum fanguinis copia, perque totum ferè gftationis decurfum retardatus fanguinis effluxus per nota viarum, propter altas quas egit utero placen- tæ radices, immo quali fufflaminatus à longo fanguinis impetus, rupto tandem obice fugit per aperta vaforum oftia: hæc evacuatio lochiorum infignita nomine peragitur bo- nis omnibus; huic exeunti falutiferè moras injicere fit relligio: quot inde nata malorum agmina! Lochiorum datâ occasione, quæris forfitan undè diftinguantur Lochiorum effluxus boni & laudabiles, à pravis & mali moris. Hæc quæftio eò reducitur ad illorum quantitatem & qualitatem: quantitate finit moderata fem- per habitâ ratione temperamentis: primis duntaxat à partu diebus purpureum fervent colorem, hos ultra fi perfeverent colore tingi intenfe rubro, jam ar- guunt fluxum immodicum, vaforumque diuturniorem hiatum, aut incidit fufpi- cio concreti fanguinis grumi, alteriulve corporis quantumvis exigui intra uteri cavitatem laticantis, adherentifve pertinacius. Lochiorum computa paucitatem ex fymptomatis, ex illis enim folis penfanda illorum in evacuando avaritia. Quod pertinet ad qualitatem, fenfum pallido rubræ tranfeant ad albedinem; fic cognof- ces fibi reftitutum fibrarum uteri claterem, diminutum vaforum diametrum, fic brevi fibi fimilem facturum uterum pronuntiabis. Conftitentiæ fint tenuis & æqualis, odorif expertes, acridinis fenfu immunes, ut pateat, nec iniquo halitu infici purpurei laticis fontes, putredine inflammatione-ve nec corripî, nec ten- tari minimum uteri fubftantiam.

\* *Henricus à Devent. ars ob- ftetricis. cap. 9. 10. 11.*

\* *Id. ibidem cap. 9.*

\* *Lib. de nat. mulieb. Lib. 2. de morb. mulieb.*

**I**STA ne ad uteri inflammationem post partum conferunt? Ita prorsus. Inde enim intelligere est quot, quanta, qualis momenti requirantur in partus opere: inde noscere est partus discrimina. Immo ut morbus nihil aliud est quam functionum depravatus ordo; ex accuratâ functionum in statu naturali notitiâ, emergit facilius & plenior earundem in morbosâ diathesi læsionis cognitio. Resumenda igitur est genuina inflammationis uteri post partum æthiologia, à totidem quæ requiruntur conditionibus felicem ut habeat partus exitum. Sed ante definiendum est quid sit inflammatio vel phlegmone in genere, veniet inde facilius uteri inflammationis post partum notitiâ. Quamquam morbus inflammationis, ut plerique alij, primo Medici acutè cernentis immotescit intuitu, suisque se signis profert facilius, quàm verbis potest explanari. Phlegmone est affluxus humoris in partem cum tensione & dolore. Hujus ut diversi gradus, sic diversæ sunt species, hæc recensere supervacaneum. Quidquid igitur affluxum humoris in partem evocabit cum tensione & dolore, accerset inflammationem. Quidquid pariter alliciet in uterum hunc contra naturam affluxum, uterij pariet inflammationem: atqui plurima sunt, & quidem majora numero, quæ hoc genus inferunt ægritudinis post partum: ea scilicet quæ uteri fibras vellicant diutius, pun- gunt acutis, distorquent immanis, dirisve modis discruciant, vel quæ post partum solitos naturæ motus in evacuando præpediunt. Hos producent affectus in pariendo difficultas summa, labores violenti & diuturni, partus contra naturam, contractatio obstetricis importuna, violentior placenta tenacioris evulsio, moliorisve & male coherentis iterata detractio, ictus vel casus in regionem uteri post partum, graviora animi pathemata, ira, metus, tristitia, pavor, Lochiorum præsertim suppressio, Phlegmonis uteri vel causa primaria, vel comes individua, strictior fasciarum circumvolutio, aëris frigidioris intus admissio, medicamenta calidiora, acra, fortiora emmenagoga, fortis & secundinas pellen- tia, specifica, ut aunt, quæ sanguinem exagitant, incendunt, protrudunt san- guinis globulos ultra vasa non sua in canales minoris diametri, undè tensio, dolor, temperamentum denique sanguineo vel bilioso plethoricum.

Miseris uterum tot obnoxium calamitatibus, ita pronum ad phlogosim? ne mireris; fævet ipsa structura partium, ipsam incusa. Licet enim ad usus genitabiles sit apprime accommodata, licet partes generationis fuerint ædificatæ firmo æque ac sublimi artificio, & ad opus suum concinnæ; ex quo tamen homo totus est à naturâ morbus, tam firma, tam elegans partium symmetria vertitur ipsa in ruinam sui, maximè in partus opere, quod sic probare licet. Diximus partium inflammationem oriri ab humorum affluxu & derivatione à majoribus vasis in minima cum tensione & dolore; ostendimus uterum hunc contra naturam affluxum posse suscipere, causasque enarravimus: dabis mihi nullam corporis partem liquorum contra naturam affluxu suscipiendo debere magis esse idoneam, quàm ea quæ in statu naturali abundantioribus irroratur liquorum succis, quàm ea quæ est ampliori instructa vasorum omnis generis suppellectile, nervorumve gaudet ditiori apparatu; atqui sic se res habet in utero maximè post partum, quod demonstrandum superest.

Immensa sanè vasorum leges quæ pullulat in abdominis visceribus; hujus partem vindicat sibi maximam uterus. Singula abdominis viscera accipiunt, ut plurimum, unicuique arteriarum ramum, majorem vel minorem habitâ ratione mo-

lis & functionis: uterus, etiam ante partum, quantumvis exiguus, affectat sibi quatuor insignes arteriarum rivos, arterias duas spermaticas, iliacas totidem aortæ descendentis soboles; nec satis est, mutuatur à viscerum latè vicinià vasorum propagines. Vasa hæc innumera augescante utero, ut extendi facillè valeant, immò majorem ut contineant sanguinis copiam, non recto tramite uterum ingrediuntur, non sunt in longum protensa, sed innumeris sibi invicem contorta modis serpentino gressu totam uteri perreptant substantiam. Venarum alvei, ne fiat sanguinis circuitus celerior, immò purpureum laticem ut asservent diutius, ut aggerant copiosius, suis orbantur valvulis, ascendentem remeant viam gyris & anfractibus asperam: ut difficilis liquorum reditus, sic facilis illorum appulsus ad uterum, faveat uteri situs, faveat perpendicularis vasorum descensus; nec desideres liquorum fontes uberrimos; cogita perspirationis defectum, aspice aortæ descendentis truncum multò capaciorem in foeminis quàm in viris: crescente fœtu, crescit uteri moles nec minuitur illius crassities, \* quæ latebat priùs per uteri substantiam diffusa numerosa vasorum familia, jugi sanguinis accessione dilatatur sensim, ampliatur magis ac magis; instante partus tempore, vasa sunt ampli & conspicui vasorum sinus, innumeris undique sese osculantes anastomosibus totam occupant uteri substantiam, jamque est uterus vasorum reti simillimus. Mitto nervorum insignem apparatus, nervus utrimque intercostalis se dat utero totus, huic se jungunt comites nervi à sacris & lumbaribus. De membranis nihil addam, Peritoneo sese subjecit uterus. .... jam verò parti ita membranosa, ita vasculosa, ita nervosa, accedat causa maximè irritans: vasa sanguine fœta & ruptioni proxima, cohibito Lochiorum effluxu, inimicà non depleantur liquorum redundantia, & erit locus inflammationi omnium maximæ. Porro multæ sunt inflammationis uteri post partum causæ, ipsamet structura partium uterum inflammationi primum comprobat, signa describere monet rerum ordo.

## III.

**M**ORBORUM signa describere, id quidem pendet ab observatione. In observando, morborumve delineando ad vivum expressas imagines, cæteris palmam præripit Medicorum antiquitas, Medicorumque Princeps Hippocrates. Si ex partu, inquit, \* uteri inflammationem conceperint, febris levis corpus detinet, & oculorum caligo adest. Ventrem verò incendium nunquam deserit, sili & coxendicium dolore vexatur, inus venter vehementer intumescit, & alvus turbatur, dejectio mala est & graveolens, vebemens febris invadit, cibi fastidium detinet, & ad sinciput dolor pertingit, neque ventriculi stomachus potus & cibos attrahere neque coquere: ac nisi cesset currentur plurimè intereunt. Aliàs sic legere est \*. Si inflammationem senserit uterus, contrahitur, quod si quid corruptum fuerit, & recruduerit, febris acuta & magna, horrorque detinet, partes circa pudenda duræ sunt, stupendum in modum afficitur, mordetur, & impetu feritur. Ac si quis immisso digito contrectet rursus pejus habet & mordetur, caput & sinciput dolore afficitur, caligo & frontis sudor adest, extrema perfrigerantur & tremunt, interdum sopor occupat, audire non solet, multum est cibi fastidium, neque stomachus, neque ventriculus omnino cibum attrahit, visceratur, cum impetu profusus, dolor est ad pubem, inguina, lumbos, & occulta muliebris pudendi loca, celeriterque moriuntur.

Cum verò Lochiorum suppressio inflammationem uteri post partum aut semper comitetur, aut producat aliquando, quid importet periculi quæve in-

\* *Hænicus a Deventer cap. 8. 9.*

\* *Hipp. Lib. 1. de morb. mulierum sect. 1.*

\* *Lib. 2. de morb. mulierum sect. 5.*



ferat symptomata, referte non erit alienum. Sic habet divinus Senex \*. *Nisi à partu purgamentis mulier repurgetur, magno morbo tentabitur, vitæque periculum incurret, nisi quis celeri adhibita curatione convenientem purgationem promoveat. Et aliàs. \* Si modica purgatio mulieri procedat, vehemens dolor lumbos occupat, omnesque partes pudenda complectentes & caput intumescunt, femoræque incenduntur, ex ore & naribus pituita valde aquosa effluit, caput dolet, febris & horror detinet, intumescit, dentes fremunt, venter & vesica ei constringuntur, oculos obvertit, & caliginosa cernit. .... quod si eam atigeris totum corpus dolet, præcipue si quis ventrem atigerit, subindeque oris ventriculi morsu conficiatur, lumborum dolore vexatur, cibi fastidium adest, vigilia & corporis compunctio.*

\* Lib. 2. de nat. tur. præc. Scit. IV.

\* Lib. 1. de mor. mulier. Scit. V.

Præter generalia uteri inflammationis signa, habenda ratio est loci præcisè affecti: non enim semper totus uterus corripitur inflammatione, id raro accidit, sed phlegmone occupat sæpius uteri collum, interdum partem uteri anticam, aliquando posticam, non numquam alterutrum latus; hæbet sua signa quæque morbi sedes. Si, quod sæpius, phlegmone tentatur uteri cervix præter generalia signa, adest febris acuta de naturâ Lipyræ, os uteri arctè clausum est, intus retractum \*, multis tenuibus venulis veluti araneorum telis implicatur \*. Si magis afficitur pars uteri anterior, in partem mali venit vesica, propter viciniam levi corripitur inflammatione, unde urinæ difficultas & stillicidium \*. Ad pubem denique perferentur dolor. Laborat-ne magis pars postica? Propter nervorum consensum, vasorumque communionem sollicitatur rectum intestinum, coxæ dolent, & lumbi, & supprimitur alvus. Si in latere plus vitii est, adest tensivus dolor ad inguina ejusdem lateris, crus gravitate & stupore afficitur, difficilis est in latus sanum decubitus, & quali procumbentis molis molesta sensatio; propterque membranarum continuitatem ad claviculas usque porrigitur vellicationis sensus: dolet præsertim capitis pars anterior ad fundum orbitæ, id pluribus locis annotat Hippocrates \*; quod nec fortuito accidere, nec temerè dictum existimes: sequere nervorum systema, nervus sympathicus major vulgo intercostalis \* projicit nervi ramusculum nervo orbitali vel opthalmico Willisii.

\* Sennert. Lib. 4. cap. 13.

\* Lib. 2. de mor. mulierum.

\* Hipp. Aphorism. 58. Scit. 6.

\* Locis supra notatis & alib.

\* Willisii ex anat. Tract. de nervis n. 157.

Non una inflammationis species uterum fatigat post partum. Signa phlegmonis id est inflammationis à sanguine vidimus modo, at si prædominetur in fœminâ temperamentum bilioso-plethoricum, si laborum diuturnitate, dolorumve acerbitate excaudit bilis: humor naturâ acris, resinofus & inflammabilis, multò graviora ingruent symptomata, furit jam non phlegmone, sed erysypelas, dictum ab Hippocrate ignis facer: Si erysypelas uteros occupet \*, pedes, mammae, & corpus intumescunt, dolor ipsam detinet, erectæ cervicis spiratio constringit, ad laterum molliudinem dolor est, ad ventris partem inferiorem pectus & caput, tremor & torpor manus detinet, inguina & poplites tremunt. Quandoque verd in inguinibus livide evadunt, & paucio tempore etiam allevat hic color. Præcipue verd mamma cognatione quâdam attolluntur. Veruntamen non admodum dolet, febris & rigor invadit, vultus rubet, sitis vehemens urget & hepar resiccatur. .... Quandoque tempore \* meliusculè habere videtur, deinde rursus iisdem afficitur, corpus pusillus refertum est.

\* Lib. 1. de mor. mulier. Scit. 5.

\* Lib. 2. de nat. mulier. Scit. 6.

Hæc sufficiant de signis inflammationis uteri post partum, Therapeiam juvat attingere.

**P**RÆCIPUUM inflammationis remedium venæ sectio celebrata in parte mali oppositâ. Inflammato utero, etiam post partum, nullum pariter præsentius remedium sanguinis missione è brachio. Hanc præcipit inflammationis Theoria, comprobet Hippocratis autoritas, evincit in observando fida sedulitas. Inflammatio oboritur ubi pars sanguinis vi adigitur ultra vasa non sua in canales minoris diametri quàm ut illos permeare facile possit, undè tensio, dolor pulsatio & cætera id genus quæ phlogosim comitantur. Celebratur venæ sectio repetita pro ægri viribus in parte mali oppositâ, sanguis evacuatür & revellitur à parte affectâ, & in his duobus tota sita est curatio. Applicentur hæc inflammationi uteri post partum: si pars affecta phlogosi, revulsionis beneficio mediante venæ sectione indigeat umquam; Certè uterus, maximè post partum, instructus ut est nervis, membranis munitus, ut sanguine tumet plethotico. Quin immò ut in feminis quam in viris multò salubrior, efficacior multò Saphenæ sectio, respectu partium superiorum, propter aortæ descendentis truncum multò capaciorem in feminis quàm in viris, undè sequitur sanguinis revulsio à parte affectâ multò abundantior: ita in feminis quam in viris nocentior multò eadem Saphenæ sectio, si partes inferiores inflammationi diathesi laborent, propter multò ampliorem eadem ratione sanguinis derivationem in partes affectas in feminis quam in viris. Et certè idem ferri debet judicium de inflammatione uteri post partum, ac ante partum, aut etiam de inflammatione aliorum abdominis viscerum; ut autem in inflammatione viscerum abdominis & uteri ante partum Saphenam tunderet nemo prudens: \* ita, & à fortiori, abstinendum à Saphenæ sectione in inflammatione uteri post partum, si, ut jam demonstratum est, post partum quam antea, abundantiores depluant in uterum undique purpurei laticis scaturigines, turgeat uteris ampliori vasorum omnis generis copiâ, accedatque nervorum spasmodica contractio vehementior. Hanc doctrinam comprobant Hippocratis autoritas. \* At si mulieri angustum iterum osculum fuerit, neque puerperio-um purgationem demiserint, inflammatione tentantur, quæ nisi brevi diligenter curetur, omnia eam magis affligent, & iter odor inde promanat, exitusque intumescit. Quod si uteri inflammatione tentati non fuerint, suapte sponte malum exu graveolens, & lividum aut nigrum & grumosum existit, & mulier à puerperii purgamentis expurgatur, Interdum verò minimè exurit: verum id mulieri exitum portendit nisi quis celeriter venam incidat, aut ventrem emolliat Per venam autem simpliciter intelligit Hippocrates brachialem, nam missionem sanguinis è pede indicat per venæ sectionem è malleolis. \*

\* Sæpienti tom.  
4. Cap. 13.  
R. varius lib.  
XV. cap. 7.

\* Lib. 1. de  
morbis mulier.

\* In lib. Hipp.  
de morbis de phlo-  
botomia Marini-  
li.

**L**ICET uteri inflammatio post partum Lochiorum cohibeat ut plurimum effluxus, & vicissim Lochiorum suppressio utero minuitur phlogosim, cautè tamen distinguenda venit uteri inflammatio à simplici Lochiorum retentione, illi ut noscitur Saphenæ sectio, sic huic interdum profutura. Queris rationem? In inflammatione uteri adest fibrarum erectus, membranarumque tensio; in simplici Lochiorum suppressione uti stasis. Judicanda sunt etiam tempora, ab initio morbi inflammationis utri quò recesseris

longius, eò tundes Saphænam minori cum discrimine. Habenda quoque ratio symptomatum; si enim reflua in pulmonem Lochiorum vis pulmonem adoriatur, proximam seca venam; si caput, remotiorem scindere aliquando præstat. At si verà phlogosi tentetur uteri substantia, mitte sanguinem è superioribus venis citò & audacter; sunt tamen qui reclamant, mitti sanguinem jubent è malleolis, ut subita derivatione in partes affectas, ruptis vasaforum obicibus, Lochiorum simul abrumpatur colluvies moribique fomes. Sic majores sub vanâ specie delusit error, ubicumque de morbis puerperarum agebatur sanguinis missionem è brachio exhorrebant. Cogi tamen Natura denegat, reduci se patitur aliquando. Qualiscumque sit primaria uteri inflammatio, nis causa, tolle phlogosim, seda eretismum, compesce placidè evacuando è venâ remotiori, liquorum æstuantium tumultus; remitte membrabranarum tensionem. Sic relaxatis, referatisque omnibus ostiis, fluent Lochiorum fontes liberrimi. Sic demum restituetur sibi uterus servatus in alteram progeniem & meliores eventus.

*Ergò uteri inflammationi post partum, vena sectio è brachiis.*

#### DOMINI DOCTORES DISPUTATURI.

<i>M. Henricus Guyot,</i>	<i>M. Franciscus Vandermonde.</i>	<i>M. Henricus Besnier.</i>
<i>M. Tuffanus - Gilbertus Boul-land.</i>	<i>M. Adrianus Malaval.</i>	<i>M. Joannes Bessé, Doctor Hispaniarum Regine, à Concilio, &amp; Medicus Primarius.</i>
<i>M. Gaspar Cochon du Puy.</i>	<i>M. Jacobus - Albertus Elazon, Altiús Præfct.</i>	<i>M. Antonius de Justieu, Regiæ Scientiarum Academiæ, Regiarumque Societatum Angliæ &amp; Prussiæ Socius, Botanices in Horto Regio Parisiensis Professor ac Demonstrator.</i>

Proponebat Parisiis, BARTHOLOMÆUS MURRY, Laonensis Hibernus, Baccal. Medicus, A. R. S. H. 1736. à 6<sup>a</sup> ad meridiem.